



SPECIFICO PER  
APPLICAZIONI FOGLIARI



AZIONE SINERGICA  
DI AMINOACIDI E  
ALGHE BRUNE



RAPIDO ASSORBIMENTO  
FOGLIARE



RIDUCE LO STRESS  
DA FENOMENI  
BIOTICI ED ABIOTICI

**Formulazione**  
Soluzione liquida

**Registro fertilizzanti**  
0015007/16

**Classificazione**  
Nessuna

**Confezione**  
1kg, 6kg



# Activostim F

Concime organico azotato liquido contenente aminoacidi ed estratto di alghe brune

## Composizione

Azoto (N) totale	8,5%
Azoto (N) organico solubile in acqua	8,5%
Carbonio (C) organico	29,0%

## Caratteristiche

Activostim F riunisce in un unico prodotto l'attività nutritiva degli aminoacidi e quella biostimolante delle alghe brune. E' caratterizzato da una miscela stabile di strutture complesse (peptidi, proteine, enzimi) potenziata da auxine, gibberelline e altri principi attivi naturali che sono alla base delle principali e molteplici funzioni fitoregolatrici dei vegetali.

Grazie alla sua elevata assimilabilità risulta particolarmente indicato nei trattamenti fogliari. Una volta penetrato all'interno della cuticola, Activostim F viene rapidamente traslocato agli organi dei vegetali più attivi sotto il profilo metabolico ed utilizzato per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori e zuccheri.

## Modalità e dosi di impiego

Coltura	Epoca	Dose fogliare
<b>Colture arboree</b>	Prefioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura	250-350 g/ha
<b>Orticole in campo</b>	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	250-350 g/ha
<b>Orticole in serra</b>	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	200-300 g/ha
<b>Colture ornamentali, Vivai</b>	2-3 interventi all'inizio del ciclo colturale	200-300 g/ha
<b>Canapa</b>	Dalla prefioritura ogni 15 giorni	250-300 g/ha
<b>Tappeti erbosi</b>	Dalla fase iniziale di crescita ogni 3/4 settimane	400-700 g/ha
<b>Colture industriali</b>	In post-emergenza	250-350 g/ha

## Suggerimenti per un corretto impiego

Per tutti gli impieghi si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento indicate. Agitare il prodotto prima dell'uso e periodicamente in caso di lunghi stoccaggi. Activostim F non va miscelato, né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni a prodotti con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl-Al, polisolfuri, triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi. Conservare a temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.

