



Zolfo Afepasa 80 WG

Fungicida a base di zolfo per la lotta all'Oidio
Granuli idrodispersibili

Caratteristiche

Zolfo Afepasa 80 WG è un prodotto a base di zolfo bagnabile in microgranuli idrodispersibili. È particolarmente indicato nei trattamenti preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal bianco, con azione collaterale di contenimento nei confronti di altre malattie fungine quali Ticchiolatura del melo. È inoltre attivo verso alcune specie di acari, in particolare gli Eriofidi. Agisce per contatto ed il suo impiego deve essere preventivo o alla comparsa dei primi sintomi della malattia. La sua particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili (WG) risulta pratica e sicura nell'impiego per l'assenza di polvere. Zolfo Afepasa 80 WG è caratterizzato da una notevole prontezza di azione grazie alle particelle più fini che lo compongono e da una maggiore persistenza garantita dalle particelle a diametro maggiore.

Modalità e dosi di impiego

Coltura	Avversità	Intervallo di sicurezza
Vite	Oidio, in situazioni di bassa pressione o nelle fasi di minore sensibilità al patogeno 200-400 g/hl; nelle situazioni ad alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza con principi attivi a differente meccanismo è possibile aumentare la dose a 600-800 g/hl.	5gg
Pomacee (Melo, Pero)	Oidio e Ticchiolatura del melo 500-600 g/hl nei trattamenti pre-floreali; 200-300 g/hl. nei trattamenti post-floreali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni.	5gg
Drupacee (Pesco, Nettare, Susino, Albicocco, Ciliegio) Mandorlo	Oidio prima della fioritura e dopo la raccolta 400-600 g/hl; dopo la fioritura 200-400 g/hl ripetendo i trattamenti ogni 10-15 giorni.	5gg
Agrumi	Oidio, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi 200-400 g/hl.	5gg
Olivo	Oidio, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi 200-400 g/hl.	5gg
Fragola	Oidio, intervenendo alla prima comparsa dei sintomi 200-500 g/hl. Dopo la fioritura è consigliabile usare la dose più bassa.	5gg
Nocciolo	Oidio ed Eriofide 200-500 g/hl.	5gg
Ortaggi Floreali, Ornamentali	Intervenire alla comparsa dei sintomi 150-250 g/hl in funzione dell'attacco. Impiegare le dosi più alte in pre-fioritura. Nelle situazioni ad alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl.	5gg
Barbabetola da zucchero	Oidio, alla comparsa dell'infezione 6-8 kg/ha proseguire con cadenza di circa tre settimane.	5gg
Cereali	Oidio, alla comparsa dell'infezione 6-8 kg/ha.	5gg
Tabacco	Oidio, alla comparsa dell'infezione 125-150 g/hl. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.	5gg

Suggerimenti per un corretto impiego

Intervenire in forma preventiva o alla comparsa dei primi sintomi della malattia utilizzando attrezzature che assicurino una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione. Nel periodo estivo trattare nelle ore più fresche della giornata. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno due/tre settimane dall'impiego degli olii minerali paraffinici.

IMPORTANTE: Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

PRATICA FORMULAZIONE IN
GRANULI IDRODISPERSIBILI



PERSISTENZA
PROLUNGATA



AZIONE REPELLENTE SU
ACARI ED ERIOFIDI

Composizione

Zolfo puro 80 g
(esente da selenio)

Formulazione

Granuli idrodispersibili

Meccanismo d'azione

FRAC M02

Classificazione



ATTENZIONE

Registrazione

N°12793 del 09.09.2008
Afepasa Azufrera y
Fertilizantes Pallarés, S.A.

Confezione

1kg, 10kg



Consentito in
Agricoltura Biologica
Reg. CE 834/2007

