

Activostim F

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida

Azoto (N) totale	8,5%
Azoto (N) organico	8,5%
Carbonio (C) di organico origine biologica	29%

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le scadenze di intervento indicate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: Epitelio animale idrolizzato fluido da pelli con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di Cr^{VI} non rilevabile, estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto direttamente mediante processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento o macinazione

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"

Fabbricante: **CERRUS s.a.s.** Via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA) tel. 02 96782108

CARATTERISTICHE: Activostim F riunisce in un unico prodotto l'attività nutritiva degli aminoacidi e quella fitostimolante delle alghe brune. E' caratterizzato da una miscela stabile di strutture complesse (peptidi, proteine, enzimi) potenziate da auxine, citochinine e altri principi attivi naturali che sono alla base delle principali e molteplici funzioni fitoregolatrici dei vegetali. Grazie alla sua elevata assimilabilità, risulta particolarmente indicato nei trattamenti fogliari. Una volta penetrato all'interno della cuticola, ActivoStim F viene rapidamente traslocato agli organi dei vegetali più attivi sotto il profilo metabolico ed utilizzato per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori e zuccheri.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO: Da applicare nei trattamenti fogliari ai seguenti dosaggi.

Coltura	Applicazione	Dosi
Colture arboree	In pre-fioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura	250-350 g/hl
Orticole in pieno campo	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	250-350 g/hl
Orticole in serra	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	200-300 g/hl
Colture ornamentali, vivai	2-3 interventi all'inizio del ciclo colturale	200-300 g/hl
Colture industriali	In associazione a diserbi di post-emergenza	400-700 g/hl

A seguito di eventi quali gelate o grandinate, intervenire al dosaggio più alto entro 24-48 ore, trattando una o più volte a distanza di 8-10 giorni.

AVVERTENZE: Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Agitare il prodotto prima dell'uso e periodicamente in caso di lunghi stoccaggi. Activostim F non va miscelato, né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni a prodotti con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl al, polisolfuri, triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi. È consigliato eseguire una piccola prova prima di impiegare il prodotto a tutto campo. Il fabbricante/distributore declina ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e applicazione del prodotto.

Peso netto: 1kg

