



## CONCIME ORGANICO AZOTATO

### Miscela di concimi organici azotati fluida

Azoto (N) totale	8,5%
Azoto (N) organico	8,5%
Carbonio (C) organico	29%

### CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prodotto ottenuto unicamente a partire dai seguenti concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica": Epitelio animale idrolizzato fluido (pellami) con concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di Cr<sup>VI</sup> non rilevabile, estratto fluido di lievito contenente alghe brune ottenuto direttamente mediante processi fisici.

Fabbricante: **CERRUS s.a.s.**  
via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA) tel.02 96782108

**CARATTERISTICHE:** Activostim F riunisce in un unico prodotto l'attività nutritiva degli aminoacidi e quella fitostimolante delle alghe brune. E' caratterizzato da una miscela stabile di molecole naturali (peptidi, proteine, enzimi) che sono alla base delle principali e molteplici funzioni fitoregolatrici dei vegetali. Grazie alla sua elevata assimilabilità risulta particolarmente indicato nei trattamenti fogliari. Una volta penetrato all'interno della cuticola, Activostim F viene rapidamente traslocato agli organi dei vegetali più attivi sotto il profilo metabolico ed utilizzato per la produzione di proteine, enzimi, fitoregolatori e zuccheri.

### MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Da applicare nei trattamenti fogliari ai seguenti dosaggi:

Coltura	Applicazione	Dosi g/hl
<b>Culture arboree</b>	In prefioritura, allegagione, ingrossamento frutti, invaiatura	250-350
<b>Orticole in pieno campo</b>	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	250-350
<b>Orticole in serra</b>	Ogni 10-15 giorni durante il periodo vegetativo	200-300
<b>Culture ornamentali, vivai</b>	2-3 interventi all'inizio del ciclo culturale	200-300
<b>Canapa</b>	Dalla prefioritura ogni 15 giorni	250-300
<b>Culture industriali</b>	In post-emergenza	250-350

A seguito di eventi quali gelate o grandinate, intervenire al dosaggio più alto entro 24-48 ore, trattando una o più volte a distanza di 8-10 giorni.

Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento indicate.

**COMPATIBILITA':** Activostim F non va miscelato né applicato separatamente a distanza di pochissimi giorni a prodotti con forte reazione alcalina, insetticidi a base oleosa, dodine, fosetyl al, polisolfuri, triforine, composti a base di stagno e di zolfo ed erbicidi non sicuramente selettivi. In caso di dubbi si consiglia di eseguire una piccola prova prima di impiegare il prodotto a tutto campo.

**AVVERTENZE:** Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Agitare il prodotto prima dell'uso e periodicamente in caso di lunghi stoccaggi. Si declina ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione e applicazione del prodotto.



Peso netto:  
**1 kg**