

Amaveg Dry

CONCIME ORGANICO AZOTATO Borlanda essiccata

Azoto (N) organico	4%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	12%
Carbonio (C) organico di origine biologica	20%

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Si raccomanda di non superare le dosi di etichetta e di rispettare le cadenze di intervento indicate. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. Il prodotto non è combustibile.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MATERIE PRIME: Borlanda essiccata da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali

Fabbricante: CERRUS s.a.s. Via Papa Giovanni XXIII, 84 - 21040 Uboldo (VA)

CARATTERISTICHE: Amaveg Dry è un preparato idrosolubile di origine interamente vegetale caratterizzato da un buon contenuto di aminoacidi naturali, azoto proteico, potassio di origine organica e sostanze nobili. In particolare, l'elevato tenore di acidi fulvici favorisce uno sviluppo equilibrato della pianta, rafforza l'attività fotosintetica e opera come fattore di crescita sull'apparato radicale sia in caso di nuovi trapianti che su piante già formate. È in grado di migliorare le qualità strutturali del terreno (chimiche, fisiche e biologiche), attivandone la microflora e la microfauna. Questa caratteristica lo rende ideale all'impiego in associazione a prodotti contenenti microrganismi del suolo quali Symbiotic, Methacol.

Coltura	Modalità e dose di applicazione in fertirrigazione	
Drupacee, Pomacee, Actinidia, Vite	Da frutto noce 2-3 interventi a distanza di 10 gg.	5-10 kg/ha
Olivo, Agrumi	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 10 gg.	5-10 kg/ha
Pomodoro, Peperone, Melanzana	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 15 gg.	1-2kg/1000 mq
Zucchino, Cetriolo, Melone, Anguria	A partire dall'allegagione 2-3 interventi a distanza di 15 gg.	0,5-2kg/1000 mq
Altre orticole	A partire dalla semina/trapianto 2-3 interventi a distanza di 15 gg.	0,5-2kg/1000 mq
Fragola e piccoli frutti	In fase di ingrossamento frutti 2-3 interventi a distanza di 7 gg.	0,5-1kg/1000 mq
Floricole e ornamentali	Dalle prime fasi vegetative, ogni 2/3 sett.	5-10 kg/ha

Coltura	Modalità e dose di applicazione fogliare	
Tutte le colture	Effettuare 2-3 interventi a distanza di 10 gg durante il ciclo colturale.	100-250 g/hl

COMPATIBILITÀ: Amaveg Dry può essere associato con i più comuni antiparassitari e concimi presenti in commercio. Evitare miscele con rame, zolfo, oli minerali o altri prodotti a reazione alcalina. Si consiglia comunque in caso di dubbi di eseguire un test di compatibilità prima dell'uso.

AVVERTENZE: Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il fabbricante/distributore declina ogni responsabilità per errata conservazione, manipolazione ed applicazione del prodotto.

Peso netto: 1kg

 **CERRUS**

