

ZOLFO AFEPASA 80 WG

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Registrazione del Ministero della Salute n. 12793 del 09/09/2008

Composizione

ZOLFO puro (esente da selenio) g. 80
Coformulanti q. b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: ---

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

AFEPASA Azufre y Fertilizantes Pallarés, S.A.

Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7

43120 Constantí - Tarragona (Spagna)

T. +34 977 524 650

Stabilimento di produzione:

AFEPASA Azufre y Fertilizantes Pallarés, S.A.

Constantí, Tarragona (Spagna)

Partita n.

Contenuto netto: g. 100-250-500; Kg. 1-5-10-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

Impiegare la dose più alta in pre-fioritura. Nelle situazioni ad alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione è possibile aumentare la dose a 500 g/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla comparsa della malattia e proseguire con cadenza di circa tre settimane.

CEREALI: contro Oidio 6-8 Kg/ha dalla comparsa della malattia.

TABACCO: contro Oidio 125-150 g/hl. Effettuare 2-3 trattamenti distanziati di circa 10 giorni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il ZOLFO AFEPASA 80 WG è un fungicida a base di zolfo in granuli idrodispersibili specifico per il controllo in viticoltura, frutticoltura, orto-floricoltura, ornamentali, colture industriali e cereali, dell'oidio, della Ticchiolatura del melo e degli acari.

Lo zolfo si distribuisce con regolarità sulla vegetazione e consente una elevata azione preventiva.

DOSI DI IMPIEGO

Il ZOLFO AFEPASA 80 WG può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

VITE: Contro Oidio 200-400 g/hl in situazioni a bassa pressione di oidio e nelle fasi di minore sensibilità al patogeno: 600-800 g/hl nelle situazioni di alta pressione infettiva e/o in programmi che prevedono l'alternanza di ZOLFO AFEPASA 80 WG con principi attivi a differente meccanismo d'azione.

POMACEE (MELO, PERO): contro l'Oidio e Ticchiolatura del melo 500-600 g/hl nei trattamenti pre-floreali; 200-300 g/hl nei trattamenti post-floreali. Ripetere i trattamenti ad intervalli di 7-12 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).

DRUPACEE (PESCO, NETTARINE, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO) E MANDORLO: contro Oidio 400-600 g/hl prima della fioritura e dopo la raccolta, alla dose di 200-400 g/hl dopo la fioritura, ripetendo i trattamenti dopo 10-15 giorni (adottando l'intervallo più breve al verificarsi delle condizioni climatiche più favorevoli alla malattia).

AGRUMI: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.

OLIVO: contro Oidio 200-400 g/hl intervenendo alla prima comparsa dei sintomi.

FRAGOLA: contro Oidio 200-500 g/hl intervenendo alla prima comparsa della malattia. Dopo la fioritura è consigliabile impiegare la dose più bassa.

NOCCIOLO: contro Oidio ed Eriofide 200-500 g/hl.

ORTAGGI, FLOREALI ED ORNAMENTALI: intervenire alla comparsa dei sintomi alle dosi di 150-250 g/hl in funzione della gravità dell'attacco.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

COMPATIBILITÀ

Lo ZOLFO AFEPASA 80 WG non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano.

Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Nei periodi di temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

Il prodotto può arrecare danno alle cultivar di:

MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvillia Bianca, Comercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranche, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese.

CUCURBITACEE: può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA